

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

Геделикс®

**Регистрационный номер:**

П N012391/02

**Торговое название препарата:**

Геделикс®

**Лекарственная форма:**

Сироп

**Состав** (на 100 мл препарата):

*Активные вещества:*

Плюща листьев экстракт (2,2-2,9:1) - 0,8000 г

*Вспомогательные вещества:*

Макрогола глицерилгидроксистеарат – 0,5000 г

Аниса звездчатого плодов масло – 0,0150 г

Гиэтеллоза – 0,1500 г

Сорбитола раствор 70% (некристаллизующийся) – 50,0000 г

Пропиленгликоль – 13,8770 г

Глицерол - 10,0000 г

Вода очищенная – 39,9605 г

**Описание**

Густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета своеобразного запаха; возможно помутнение и выпадение осадка.

**Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения

**Код АТХ**

R05CA

### **Фармакологические свойства**

Препарат растительного происхождения, оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие, обусловленное наличием сапонинов.

### **Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Геделикс® сироп нельзя принимать при наследственной непереносимости фруктозы, недостаточности аргининсукцинат-синтетазы.

### **Применение во время беременности и кормления грудью**

Геделикс® сироп не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Если врач не назначил другой дозировки, Геделикс® следует принимать внутрь (после еды):

	разовая доза	суточная доза
Взрослые и дети старше 10 лет	5 мл	15 мл
3 раза в день		
Дети от 4-10 лет	2,5 мл	10 мл
4 раза в день		
Дети от 1-4 лет	2,5 мл	7,5 мл
3 раза в день		
Дети от 0-1 года	2,5 мл	2,5 мл
1 раз в день		

В упаковке находится мерная ложечка. 1 мерная ложечка соответствует 5 мл. Взрослым и подросткам Геделикс® рекомендуется принимать неразбавленным.

Грудным и маленьким детям Геделикс® рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.

Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях – боли в эпигастральной области.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

### **Передозировка**

Симптомы: возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

В случае отсутствия лечебного эффекта на фоне приема препарата в течение 4-5 дней или ухудшения состояния больного (появление приступов удушья, гнойной мокроты, повышение температуры), следует немедленно обратиться к врачу.

Указания для больных сахарным диабетом:

Поскольку Геделикс® не содержит сахара, его могут применять больные сахарным диабетом. 1 мерная ложка (5 мл) содержит 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы), что соответствует 0,15 ХЕ.

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Сироп. По 100 мл во флаконы темного стекла со струйной пробкой из полиэтилена. Каждый флакон закрывают крышечкой с кольцом для контроля первого вскрытия и вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой из полипропилена с делениями помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения.**

В защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года

Не применять по истечении срока годности.

Срок хранения после вскрытия первичной упаковки 6 месяцев.

### **Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта

### **Наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение**

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

### **Производитель**

Кревель Мойзельбах ГмбХ

### **Юридический адрес**

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

***Место производства***

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей**

Представительство фирмы Кревель Мойзельбах ГмбХ в Москве

115114 Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 4

Тел./Факс (495) 966 00 93